

◆ 子どもの定期予防接種の種類と受け方 ◆

接種料金は無料(自治体負担)

(令和4年7月1日現在)


予防接種名	種類	予防できる病気	対象	回数	標準的な接種年齢	接種間隔	接種方法 接種量	その他	
ロタウイルス ワクチン	経口生 ワクチン	下痢・嘔吐を主 徴とするロタウ イルスによる胃 腸炎	【ロタリックス(1価)】 生後6週0日後～ 生後24週0日後まで	2回	1回目は生後2ヶ月～ 生後14週6日までに 接種し、2回目は生後 24週0日後まで	27日以上	1. 5ml 経口接種	◆ワクチンが2種類(ロタリッ クス、ロタテック)があるが、どちらを 接種しても有効性は差はない。 ◆1回目接種は、安全性の観点 から生後14週6日後までが望ま しい(生まれた日を0日として計 算)。 ◆1・2・3回目は原則として同じ 種類のワクチンを接種。	
			【ロタテック(5価)】 生後6週0日後～ 生後32週0日後まで	3回	1回目は生後2ヶ月～ 生後14週6日までに 接種し、2・3回目は生 後32週0日後まで		2. 0ml 経口接種		
ヒブワクチン (乾燥ヘモフィルス b型ワクチン)	不活化 ワクチン	インフルエンザ菌b 型による、細菌 性髄膜炎、肺 炎、敗血症など	生後2ヶ月 ～60ヶ月未満	初回接種 3回 (生後12ヶ月までに完了)  追加接種 1回	接種開始は 生後2ヶ月 ～6ヶ月以内	27日～56日(医師が認 める場合は20日～56 日)	0. 5ml 皮下注射	◆接種開始が生後7ヶ月～11ヶ 月以内の場合は初回接種2回 (生後12ヶ月までに完了)、追加 接種1回。 ◆接種開始が生後12ヶ月～59ヶ 月以内の場合は1回接種。	
小児用 肺炎球菌 ワクチン	不活化 ワクチン	肺炎球菌による 細菌性髄膜炎、 肺炎、重い中耳 炎など	生後2ヶ月 ～60ヶ月未満	初回接種 3回 (生後12ヶ月までに完了)  追加接種 1回	接種開始は 生後2ヶ月 ～6ヶ月以内	27日以上	0. 5ml 皮下注射	◆接種開始が生後7ヶ月～11ヶ 月以内の場合は初回接種2回 (生後24ヶ月までに完了)、追加 接種1回。 ◆接種開始が生後12ヶ月～23ヶ 月以内の場合は2回接種(間隔 は60日以上)。 ◆接種開始が生後24ヶ月～59ヶ 月以内の場合は1回接種。	
B型肝炎 ワクチン	不活化 ワクチン	B型肝炎	1歳未満	3回	生後2ヶ月～ 生後8ヶ月以内	・1回目終了後、27日以上 あけて2回目を接種 ・1回目の接種から139日 以上あけて3回目を接種	0. 25ml 皮下注射	※HBs抗原陽性の者の胎内又は 産道においてB型肝炎ウイルス に感染するおそれのある者 で、抗HBs人免疫グロブリンの 投与に併せて組換え沈降B型肝 炎ワクチンの投与を受けたこと のある者は対象外です。	
四種混合	不活化 ワクチン	百日せき ジフテリア 破傷風 ポリオ	生後3ヶ月 ～90ヶ月未満	初回接種 3回  追加接種 1回	生後3ヶ月 ～11ヶ月以内	20～56日	0. 5ml 皮下注射		
二種混合	不活化 ワクチン	ジフテリア 破傷風	11歳～13歳未満	1回	11歳(小学6年生に個別通知)		0. 1ml 皮下注射	乳児期に三種混合または四種混 合を接種した方に、追加免疫をつ けるために接種します。	
BCG	注射生 ワクチン	結核性髄膜炎 粟粒結核	生後12ヶ月未満	1回	生後5ヶ月～7ヶ月以内		スタンプ方式 で上腕2ヶ所 に押し付ける	※生後12ヶ月を超えた場合は <b>任意接種</b> となります。	
麻しん・風しん 混合ワクチン	注射生 ワクチン	麻しん 風しん	1期 生後12ヶ月～ 24ヶ月未満 2期 小学校就学 1年前の年度	1回  1回	生後12ヶ月～23ヶ月以内  小学校就学1年前の年度		0. 5ml 皮下注射	◆1期および2期の合計2回接 種を受けることでより強固な免 疫を獲得します。 ◆2期は該当年度に個別通知し ます。	
水痘ワクチン	注射生 ワクチン	水痘 (水ぼうそう)	生後12ヶ月～ 36ヶ月未満	2回	1回目:生後12ヶ月 ～15ヶ月 2回目:1回目接種後 6ヶ月～12ヶ月	1回目接種後3ヶ月以上 (標準的には6ヶ月～ 12ヶ月)の間隔において 2回目接種	0. 5ml 皮下注射	◆合計2回接種を受けることで より強固な免疫を獲得します。 ◆既に水痘にかかったことのある 者は定期接種の対象外です。	
日本脳炎 ワクチン	不活化 ワクチン	日本 脳炎	定期 対象	1期 生後6ヶ月 ～90ヶ月 未満	1期初回接種 2回  1期追加接種 1回	3歳以上 4歳未満  4歳以上 5歳未満	6日以上、標準的には6日～28日ま での間隔において2回接種  初回接種終了後6ヶ月以上、標準的 にはおおむね1年を経過した時期に 1回接種	【3歳以上】 0. 5ml 皮下注射 【3歳未満】 0. 25ml 皮下注射	◆接種の予約は希望す る市内各医療機関へ直 接ご予約ください。  ◆令和3年度から日本脳炎ワク チンの供給不足に伴い、市保健 係への予約としましたが、供 給状況が回復しましたので、予 約先を各医療機関に変更してお ります。
				2期 9歳以上 13歳未満	1回	9歳(小学4年生に個別通知)	0. 5ml 皮下注射		
			特例 対象者	1期 平成19年4月2日～ 平成21年10月1日 生まれ	1期初回接種 2回  1期追加接種 1回	13歳未満	6日以上、標準的には6日～28日ま での間隔において2回接種  初回接種終了後6ヶ月以上、標準的 にはおおむね1年を経過した時期に 1回接種	0. 5ml 皮下注射	
				1期 平成19年4月1日以前に 生まれた方	1期初回接種 2回  1期追加接種 1回	20歳未満	6日以上、標準的には6日～28日ま での間隔において2回接種  初回接種終了後6ヶ月以上、標準的 にはおおむね1年を経過した時期に 1回接種	0. 5ml 皮下注射	
子宮頸がん ワクチン (HPVワクチン)	不活化 ワクチン	ヒトパピローマ ウイルス(HP V)の感染症を 防ぎ、子宮頸 がんなどの発 症を予防しま す	【定期接種】 小学6年生～高校1年 生相当の年齢の女子	【サーバリックス(2価)】 3回	中学1年生	・1回目と2回目は1ヶ月の間隔をおく ・3回目は1回目から6ヶ月以上の間 隔をおく。または、1回目から5か月 以上かつ2回目から2ヶ月半以上の 間隔をおく。	0. 5ml 筋肉内注射	◆積極的勧奨を差控えていま したが、国の通知に基づき令和 4年4月から個別通知を再開し、中 学1年生以上の対象となる方に 順次案内を送付します。小学6 年生で接種を希望する方は予診 票等を送付しますので、市保健 係へご連絡ください。 ◆ワクチンの効果やリスクにつ いては、市の説明書や厚生労働 省リーフレット等をご覧になり、 接種を希望する方は、市内医療 機関にご予約ください。	
			【キャッチアップ接種】 平成9年4月2日～ 平成18年4月1日生まれ の女性は、令和7年3月 までの3年間は無料で 接種できます。	【ガーダシル(4価)】 3回	中学1年生	・1回目と2回目は1ヶ月以上の間隔 をおく ・3回目は1回目から6ヶ月以上の間 隔をおく。または、2回目から3ヶ月 以上の間隔をおく			

※接種間隔など不明なことは、市保健係(TEL52-3106)へご相談ください

## ◆◇ 接種間隔の注意 ◇◇

### 【異なるワクチンの接種間隔】

注射生ワクチンと注射生ワクチンの間のみ接種してから27日以上あけ、その他のワクチンの間隔には制限はありません。



### 【同じワクチンの接種間隔】

同じワクチンを複数回接種する時の接種間隔は、「子どもの定期予防接種の種類と受け方」の「接種間隔」とおりですので、ご確認ください。